



Dr. med. vet. Simone Konopka  
Eckhof 1  
24582 Hoffeld  
Mobil: 0173 - 2462533  
Internet: www.chiro-vet.de  
E-Mail: siko@chiro-vet.de

## Frühbeurteilungsschema zur Bewertung des Gesundheitsstatus von neugeborenen Fohlen zwischen 6. und 24. Lebensstunde (Giessener Vorsorgeschema II)

Normale Entwicklung in **den ersten 6 Lebensstunden danach:**

### 1. Stehvermögen

- |  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| >> Vollständiges Stehvermögen und koordinierte Bewegung              | 3 | <input type="text"/> |
| >> Stehvermögen unsicher, taumelnde, unkoordinierte Bewegung         | 2 |                      |
| >> Häufige Liegen, schwerfälliges Aufstehen, unkoordinierte Bewegung | 1 |                      |

### 2. Körpertemperatur

- |                   |   |                      |
|-------------------|---|----------------------|
| >> 38,2 - 39,0 °C | 3 | <input type="text"/> |
| >> > 39,2 °C      | 2 |                      |
| >> < 38,0 °C      | 1 |                      |

### 3. Mekoniumabgang

- |   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| >> Normal bis 8 Stunden nach der Geburt, danach Milchkot                  | 3 | <input type="text"/> |
| >> Geringe Menge, häufiges Pressen, zunehmende Unruhe                     | 2 |                      |
| >> Kein Kotabsatz beobachtet, häufiges Pressen, Unruhe, Liegen und Wälzen | 1 |                      |

### 4. Harnabsatz

- |   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| >> Normal im Strahl mehrfach nach der Geburt in genügender Menge      | 3 | <input type="text"/> |
| >> Häufiger Harndrang mit Absatz kleiner Portionen oder in Tropfen    | 2 |                      |
| >> Kein Harnabsatz, trotz häufiger Harnabsatzposition (weibl./männl.) | 1 |                      |

### 5. Atmung

- |   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| >> Regelmäßig und gleichmäßig           | 3 | <input type="text"/> |
| >> Unregelmäßig                         | 2 |                      |
| >> Stossweise - flach, geblähte Nüstern | 1 |                      |

### Kontakt mit Muttertier

- |   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| >> Regelmäßiger Kontakt mit Aufsuchen des Euters und Sauggeräuschen | 3 | <input type="text"/> |
| >> Abstand zur Mutter erheblich, kaum oder abnehmender Euterkontakt | 2 |                      |
| >> Umherirren ohne Mutterkontakt, kein Aufsuchen des Euters         | 1 |                      |

---

Gesamt

Punktzahl:            18            Punkte            vitales Fohlen  
                         17-15       Punkte            gefährdetes Fohlen  
                         <15           Punkte            hochgeradig gefährdetes Fohlen